

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE “CORSO SULLE DROGHE D’ABUSO”

1. L’eroina è:

- a. Un prodotto naturale
- b. Un prodotto di sintesi
- c. Estratta dall’oppio

2. Il Delta-9 Tetraidrocannabinolo è presente in maggior quantità nelle:

- a. Foglie
- b. Infiorescenze
- c. Radici

3. La cocaina è:

- a. Un anestetico locale
- b. Un antispastico
- c. Un antibiotico

4. Il crack è:

- a. Cocaina cloridrato
- b. Cocaina base
- c. Cocaina grezza

5. La codeina è:

- a. Dolcificante
- b. Antitussivo
- c. Cardiotonico

6. La tolerance è un fenomeno:

- a. Permanente
- b. Temporaneo
- c. Letale

7. L’ectasy è:

- a. Una benzodiazepine
- b. Un oppioide
- c. Un’anfetamina

8. L’ectasy è utilizzata sottoforma di:

- a. Compresse
- b. Sciroppo
- c. Gas

9. La papaverina estratta dall'oppio è utilizzata come:

- a. Antidiabetico
- b. Antispastico
- c. Antitussivo

10. L'LSD è un prodotto ad attività:

- a. Analgesica
- b. Allucinogena
- c. Antistaminica

11. Con quale meccanismo agiscono gli oppiacei?

- a. Mimano gli effetti di sostanze endogene dell'organismo a livello di specifici recettori
- b. Agiscono a livello della membrana delle cellule nervose
- c. Interagiscono con molecole dell'organismo
- d. Come antimetaboliti

12. La dipendenza da oppiacei è uno stato psicologico ma anche fisico caratterizzato da:

- a. Una forma di intossicazione cronica o periodica
- b. Desiderio/bisogno irrefrenabile di utilizzare sostanze ad azione stupefacente
- c. Tendenza ad aumentare progressivamente la dose
- d. Tutte queste caratteristiche

13. Quale di questi farmaci utilizzati nel trattamento delle dipendenze da oppiacei possiede attività di AGONISTA PURO:

- a. Metadone
- b. Buprenorfina
- c. Naltrexone

14. Quale di questi farmaci utilizzati nel trattamento delle dipendenze da oppiacei possiede attività di ANTAGONISTA:

- a. Metadone
- b. Buprenorfina
- c. Naltrexone

15. Quale di questi farmaci utilizzati nel trattamento delle dipendenze da oppiacei possiede attività di AGONISTA-ANTAGONISTA:

- a. Metadone
- b. Buprenorfina
- c. Naltrexone

16. Quale via di somministrazione è utilizzata per il Metadone nella terapia di dissuefazione agli oppiacei ?

- a. via orale
- b. via parenterale
- c. via rettale

17. Qual è la via di somministrazione della Buprenorfina nella terapia di sostituzione degli oppiacei negli stati di dipendenza?

- a. Intramuscolare
- b. Endovenosa
- c. Sublinguale

18. Quali vantaggi offre il Metadone nel trattamento della dipendenza da oppiacei?

- a. Buona biodisponibilità
- b. Lunga emivita plasmatici
- c. Somministrazione in un'unica dose giornaliera
- d. Attività per via parenterale endovenosa
- e. Velocità d'azione
- f. Scarsa tossicità
- g. Buona compliance